

Grammi di polvere di latte necessari per ottenere un latte ricostituito al 3,5% di grasso

% lipidi grezzi nel latte in polvere (cartellino)	A - grammi di polvere concentrazione grammi + litro	B - grammi di polvere concentrazione grammi/litro
24 %	171 g	146 g
23 %	179 g	152 g
22 %	189 g	159 g
21 %	200 g	167 g
20 %	212 g	175 g

Protocollo sanitario caprette dalla nascita alla riproduzione (aspetti essenziali)

1° mese nascita e crescita	<ul style="list-style-type: none"> In caso di specifiche profilassi sanitarie (CAEV, Paratubercolosi, Malattia degli ascessi o altro) separare immediatamente i nati dalle madri per evitare qualsiasi contatto; Effettuare immediatamente disinfezione del cordone ombelicale con tintura di iodio, immergendolo interamente fino all'attacco addominale; Rimozione abbozzi cornuali: peso alla nascita < 3 kg decornare a 12-14 gg; peso alla nascita > 3 kg decornare a 7-10 gg; Eventuale prima vaccinazione per Pastorellosi e Clostridiosi a partire dalla 1° settimana di età; Effettuare esame delle feci per 1° controllo coccidi a 30 giorni d'età.
2° mese crescita e svezzamento	<ul style="list-style-type: none"> Effettuare trattamento anti-coccidico allo svezzamento o una decina di giorni prima; Eventuale richiamo vaccinazione per Clostridiosi e Pastorellosi se vaccinato nel mese precedente (4 settimane).
3° - 4° mese sviluppo ruminale	<ul style="list-style-type: none"> Effettuare esame delle feci per 2° controllo coccidi ed eventuale trattamento.
5° - 8° mese abitudini alimentari e riproduzione	<ul style="list-style-type: none"> Effettuare esame parassitologico delle feci ed eventuale trattamento prima delle monte; Concludere eventuali piani vaccinali delle malattie abortive 30 giorni prima delle monte.

Mortalità caprette e valori di riferimento che si possono considerare accettabili:

- Mortalità neo natale (1° settimana) ≤ 2%
- Mortalità post natale (2° - 8° settimana) ≤ 6 - 8%
- Mortalità totale nascita - svezzamento ≤ 8 - 10%**

Parametri di benessere ambientale

Età mesi	Fasi ed obiettivi	Sup. lettiera m ² /capo	Volume m ³ /capo	Fronte mangiat. cm/capo	Velocità aria m/s	Temp. neutra	Temp. adattam. facile
0 - 1 mese	Nascita e crescita (tutte)	0,25	2 - 4	25	< 0,25	primi 5 g 13° - 20°	primi 5 g 7° - 25°
1 - 2 mesi	Crescita e svezzamento (macello, rimonta)	0,33	3 - 6			1° mese 10° - 18°	1° mese 3° - 25°
3 - 4 mesi	Sviluppo ruminale (rimonta)	0,5	4 - 6	33	0,5 - 1,0	6° - 16°	0° - 25°
5 - 7/8 mesi	Abitudini alimentari e riproduzione (rimonta)	1,0					
9 - 12 mesi	Preparazione al parto (rimonta)	1,5	5 - 10	> 33			